

Pesguard® Gel

Categoria : PMC

Esca insetticida pronta all'impiego contro gli scarafaggi per uso professionale

Registrazione Ministeriale:

n. 20220

Formulazione:

Gel

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Pyriproxyfen: 0.5000g
clothianidin: 0.5000g

Caratteristiche:

Insetticida con azione attrattiva, per il controllo dei vari tipi di scarafaggi (*Blattella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis, Periplaneta americana).*

Modalità d'impiego:

Per la distribuzione, togliere il cappuccio di protezione, porre il beccuccio a contatto con la superificie da trattare e premete lo stantuffo dell'erogatore per far fuoriuscire il prodotto. Rimettere il cappuccio di protezione dopo l'applicazione.
Impiegare il prodotto distribuendolo nelle fessure, nei luoghi nascosti e nelle aree frequentate dagli scarafaggi, dove questi si alimentano e riproducono. Si tratta in genere di spazi caldi, umidi e bui, posti dietro a mobili, bollitori, radiatori, frigoriferi, tubazioni, ecc. Applicare il prodotto in spazi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici. Assicurarsi che non vi siano

nelle vicinanze dell'area da trattare alimenti che possano attrarre gli insetti e che le superfici trattate non vengano lavate o pulite. Non utilizzare il prodotto su superfici grasse, impolverate o dove sono stati applicati insetticidi ad azione repellente, senza prima aver effettuato un lavaggio. Non distribuire il prodotto su tessuti, tappeti o a contatto di dispositivi elettrici. L'effetto insetticida si manifesta già dopo poche ore da una singola assunzione di prodotto da parte degli scarafaggi. In genere a distanza di 24 ore dall'applicazione del prodotto sono visibili nei locali infestati gli insetti morti.
Si consiglia di effettuare controlli dopo 2 settimane dall'applicazione e di riapplicare il prodotto nel caso questo sia stato consumato.

Dosaggio e applicazione

Pesguard Gel deve essere utilizzato in punti, ciascuno di circa 4 mm di diametro (circa 0,032 g di prodotto a punto). Il numero di punti può variare in relazione al grado di infestazione:
– infestazione limitata o normale: 3-6 punti/m^2
– forte infestazione: 6-10 punti/m^2
– trattamenti di mantenimento: 1-2 punti /m^2

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

– Conservare fuori della portata dei bambini
– Conservare lontanto da alimenti o mangimi e da bevande
– Conservare la confezione ben chiusa
– Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
– Non contaminare durante l'uso alimenti o bevande o recipienti atti a contenerne
– Lavarsi accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso o in caso di contatto con la pelle
– Non disperdere il contenitore dopo l'uso
– Contenere il prodotto nel suo contenitore originale

Confezioni di vendita:

Blister contenente 4 Siringhe

Note:

Titolare: Sumitomo Chemical Co., Ltd ® Marchio registrato Sumitomo Chemical
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.