

RATACUM BLOCCO PARAFFINATO per professionisti formati

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato
USO PROFESSIONALE
CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI FORMATI
AREA DI UTILIZZO ALL' INTERNO, ALL'ESTERNO INTORNO AGLI EDIFICI ed AREE APERTE.

Registrazione Ministeriale:

(PT14) - Aut. n. IT/2012/00027

Formulazione:

Blocco paraffinato

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Difenacoum 0.0050 g
Denatonio Benzoato 0.0010 g

Caratteristiche:

RATACUM BLOCCO PARAFFINATO è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus), Ratto nero (Rattus rattus) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.
RATACUM BLOCCO PARAFFINATO contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

RATACUM BLOCCO PARAFFINATO per professionisti formati

"Difesa dai Roditori"

Rodenticidi

RATACUM BLOCCO PARAFFINATO può essere usata
all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini,
depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage,
ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.
All'esterno e nelle aree aperte

Modalità d'impiego:

DOSI E MODI IMPIEGO
Uso all'interno di edifici Per il controllo del Topolino Do-mestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus).
Topolino Domestico (Mus musculus): posizionare 40 g di RATACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus): in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATA-CUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi cia-scuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RA-TACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
In caso di esche permanenti: posizionare 60-100 g di RA-TACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento.
Per l'utilizzo come esca permanente: ove possibile, si rac-comanda di rivisitare l'area trattata al massimo ogni 4 setti-mane al fine di evitare la possibile selezione di una popola-zione resistente. Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti.
Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili a-stanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Consi-derare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuo-vere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, du-rante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e rac-cogliere i roditori morti, conformemente alle raccomanda-zioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tec-nica di 'pulsed baiting'.
In caso di utilizzo di "permanent baiting": il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. La strate-gia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodica-mente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, pre-venire che l'esca entri in contatto con l'acqua.
Uso all'esterno, intorno agli edifici Per il controllo del To-polino Domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus nor-vegicus) e ratto nero (Rattus rattus).
Topolino Domestico (Mus musculus): posizionare 40 g di RATACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus): in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATA-CUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi cia-scuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RA-TACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
In caso di esche permanenti: posizionare 60-100 g di RA-TACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento.
Per l'utilizzo come esca permanente: ove possibile, si rac-comanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 setti-mane al fine di evitare la possibile selezione di una popola-zione resistente.
Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti: per uso e-sterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi

strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei con-fronti delle specie non bersaglio.
Non applicare il prodotto direttamente nelle taneOve possibile, prima del trattamento, informare i possibili a-stanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Consi-derare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuo-vere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, du-rante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e rac-cogliere i roditori morti, conformemente alle raccomanda-zioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
In caso di utilizzo di "permanent baiting": il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. La strate-gia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodica-mente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di si-stemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.
Uso all'esterno, aree aperte Per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus) e ratto nero (Rattus rattus).
Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus): in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATA-CUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi cia-scuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RA-TACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
In caso di esche permanenti: posizionare 60-100 g di RA-TACUM BLOCCO PARAFFINATO per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.
Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o conta-minate dalla sporcizia. Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento. Seguire ogni ulteriore istru-zione previste dalle buone pratiche pertinenti.
In caso di utilizzo di "permanent baiting": ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 set-timane al fine di evitare la possibile selezione di una popo-lazione resistente.
Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti: per uso e-sterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei con-fronti delle specie non bersaglio.
Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili a-stanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Consi-derare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuo-vere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, du-rante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e rac-cogliere i roditori morti, conformemente alle raccomanda-zioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tec-nica di 'pulsed baiting'.
In caso di utilizzo di "permanent baiting": il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. La strate-gia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodica-mente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile reinfestazione.
Non applicare il prodotto direttamente nelle tane. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superfi-ciali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, preveni-re che l'esca entri in contatto con l'acqua.

Avvertenze:

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita
Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile cause e l'entità dell'infestazione.
Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione

di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.
Il prodotto deve essere usato unicamente nell'ambito del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.
Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione.
I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).
Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad al-tre strutture.
I contenitori per esche devono essere chiaramente etichet-tati segnalando che contengono rodenticidi e che non devo-no essere rimossi o aperti.
Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trat-tamento.
Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.
L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascina-ta fuori dal contenitore per esche.
Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non ber-saglio.
Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono en-trare in contatto con il prodotto.
Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodot-to. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.
La frequenza delle visite all'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce del sopralluogo condotto all'inizio del trattamento. La frequenza deve essere conforme alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione e-vidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo for-mulazione d'esca.
Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminu-zione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: conside-rare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più effica-ce. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alter-nativa di controllo.
Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche ri-maste o i contenitori con le esche.
Pericoloso per la fauna selvatica

Unità di vendita:

scatola 15 kg

Note:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.